



*Rosa Rubiginosa triflora.*

P.J. Redouté pinx.

*Rosier Rouille à trois fleurs.*

Imprimerie de Bouché

Chapuy sculp.

## LES ROSES.

93

### ROSA RUBIGINOSA

(*Triflora*; voyez ci-après, non 1.)

#### LE ROSIER ROUILLE, A TROIS FLEURS.

##### DESCRIPTION.

Ce Rosier, très-commun dans les haies et dans les buissons, s'élève à la hauteur de cinq à six pieds; ses tiges sont munies d'aiguillons nombreux, crochus et inégaux. Les folioles, au nombre de cinq à sept, rudes au toucher, sont couvertes dans leur surface postérieure et en leurs bords, de poils glanduleux, visqueux, souvent roussâtres, exhalant, sur-tout lorsqu'on les froisse dans les doigts, une odeur vineuse assez agréable. Les fleurs, réunies par deux, trois, ou cinq, à l'extrémité des rameaux, sont supportées par des pédoncules hispides. Le tube des calices est ovoïde et glabre; les styles sont velus et peu saillants, enfin les stygmates se réunissent en une tête convexe au centre de la fleur.

Description spécifique et Nomenclature des variétés de ce Rosier.

##### R. RUBIGINOSA.

R. Geraniifolia ovata; glabris-ve; foliis subintundis supra pubescentibus pilis margine glandulosis villis; petalis glandulosis ovatoque aculeatis; aculeis subinipalibus (N.)

\* Tuba des calices et pedoncules hispides.

- a. R. Rubiginosa vulgaris. Willd. 26. Plant. Ber. 1. pag. 156, var. 2.
- b. Rubiginosa l. mant. 564. Treillier, H. de Paris, ed. 2, p. 250.
- c. Rubiginosa hirta. Desv. Journ. Bot. 1813, p. 218, var. 2.
- d. (Eglantaria) Roxb. Tab. 16. Pedoncules le plus souvent uniflores. Vulg. Eglantier rouge. Eglantier à odeur de pomme de reinette.
- e. R. Rubiginosa olivacea. Desv. L.c. var. 1. Tube petit, oliviforme.
- f. R. Rubiginosa Oxyria. B. (Crotia) montana foliis subintundis glutinosis et villis. TOURNEF. ercol. 53. An Rubiginosa sphaerocarpa? Desv. L.c. p. 217, var. 1. Croît dans les îles de la Grèce. L'individu de M. Desv. se trouve sur les Alpes.